



# FICHA TÉCNICA



Distribuido por:



**SummitAgro del Ecuador**

Av. Pampite s/n y Pasaje Donoso, Edificio Officenter

Of. 315, Cumbayá, Quito – Ecuador

Teléfono: (593) 25000134

www.summitagroecuador.com

## 2. MODO DE ACCIÓN

**GORRILLA® WG**, es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto, ingestión y es translaminar; en insectos causa inactividad, parálisis, y muerte.

**GORRILLA® WG** es mezcla compuesta de dos ingredientes activos, Emamectin Benzoato y Chlorfenapyr en una formulación WG (Gránulos Dispersables).

## 3. MECANISMO DE ACCIÓN

Chlorfenapyr es un insecticida perteneciente al grupo de los Pyrroles y es un desacoplador de la fosforilación oxidativa por perturbación del protón, esto lleva a la muerte celular y a la consecuente muerte del insecto.

Por otro lado, el Emamectin benzoate es un insecticida del grupo químico de las avermectinas y es un modulador alostérico del canal de cloruro cerrado de glutamato que actúa causando la parálisis del insecto.

## 4. EFICACIA BIOLÓGICA

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS (gr/Ha)	DOSIS (gr/L)	P.C.
<b>ARROZ</b> ( <i>Oryza sativa</i> )	<b>Langosta</b> ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	400 gr/Ha	--	28 días
<b>MAÍZ</b> ( <i>Zea mays</i> )	<b>Gusano cogollero</b> ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	300 gr/Ha	--	
<b>ROSA</b> ( <i>Rosa sp.</i> )	<b>Trips</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	450 gr/Ha	0,45 gr/L	No aplica

Volumen de aplicación: Maíz y Arroz: 400 L de agua/ha. Rosas: 1000 L/ha.



Growing by Difference

# FICHA TÉCNICA



## Época de aplicación:

Antes de usar **GORRILLA® WG** lea detenidamente la etiqueta; debe ser aplicado por aspersión foliar dirigida al control de plagas. Se recomienda realizar una rotación con productos de diferente modo de acción.

**Arroz:** Aplicar cuando exista el 5% de incidencia en el campo.

**Maíz:** Aplicar cuando exista un umbral del 20% de cogollos dañados en campo.

**Rosas:** Aplicar cuando exista un 5 % de incidencia de la plaga adultos o ninfas en botones de rosa. Realizar una aplicación por ciclo en el cultivo de arroz, maíz y rosa.

## Técnica de aplicación:

Para preparar la mezcla de aplicación llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad a aplicar según las dosis recomendadas y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua. Mantenga agitación constante de la mezcla contenida en el tanque, obteniendo durante la aplicación un cubrimiento uniforme de las plantas. Los equipos usados en la aplicación deben ser lavados cuidadosamente después de cada aplicación, por lo menos tres veces. El producto debe ser manejado dentro de un plan de manejo integrado de las plagas.

## Compatibilidad:

**GORRILLA® WG** es incompatible con plaguicidas fuertemente ácidos y alcalinos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

## Fitotoxicidad:

**GORRILLA® WG** no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

## 5. PRECAUCIONES

---

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
EVITAR CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA.**

“No coma, beba o fume durante la manipulación y aplicación”.

“Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas”



# FICHA TÉCNICA



“Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar el producto.”

“Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado”

En caso de intoxicación oral suministre al paciente grandes cantidades de agua. NO INDUZCA EL VÓMITO. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

*“Para emergencias químicas como derrames, fugas, incendios, explosiones o intoxicaciones llamar a CISPROQUIM® (Servicio las 24 horas del día)”*



FORMULADO POR:



**HanseAsia**

HANSEASIA LIMITED.

3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place Central Hong Kong

Tel: +852 81974467; Email: [info@hanseasia.hk](mailto:info@hanseasia.hk)

[www.hanseasia.hk](http://www.hanseasia.hk)



Growing by Difference