

MERIT

Azul



INICIO

Composición	%
Nitrógeno (N)	7.0
Fósforo (P ₂ O ₅)	5.0
Potasio (K ₂ O)	3.0
Manganeso (Mn)	0.077
Boro (B)	0.062
Hierro (Fe)	0.08
Cobre (Cu)	0.05
Zinc (Zn)	0.05
Molibdeno (Mo)	0.075

Uso: Fertilizante inorgánico foliar

Formulador: Seikaken Inc. – Japón

Registro AGROCALIDAD: 1220-F-AGR

MERIT AZUL - INICIO DEL CULTIVO es un fertilizante completo para aspersiones al follaje que permite balancear los desequilibrios existentes en el suelo y proporcionar una adecuada nutrición en las plantas; ayuda o reduce el problema de plagas y enfermedades por la presencia de fósforo orgánico (poli fosfito), que pasa a formar parte de las paredes celulares, haciéndolas más resistentes e induce a la formación de fitoalexinas

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Estado físico: Líquido

Densidad: 1.213 g/ml

pH: 6.2 a 7.2 (20°C)

Corrosividad: No es corrosivo

MODO DE EMPLEO

Aplicar vía foliar, disolviendo en un recipiente pequeño la dosis recomendada de MERIT AZUL, agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida. Agite la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. Aplicar en las horas de menos sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde. El equipo de aplicación terrestre o aéreo debe estar en óptimas condiciones y previamente calibrado.

CUADRO DE DOSIS

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA, VÍA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	2 l/ha*	Aplicación foliar semanal luego de la poda
Gypsophila (<i>Gypsophila paniculata</i>)	2 l/ha*	Aplicación foliar semanal en periodo vegetativo
Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i> L.)	2 l/ha*	Aplicación foliar semanal luego de la poda
Tomate riñón (<i>Solanum lycopersicum</i>)	2,5 l/ha*	Aplicación foliar semanal luego de la poda y/o desyeme en cultivo sano
Fresas (<i>Fragaria</i> sp.)	2 l/ha**	Aplicación foliar semanal luego de la poda
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	2 l/ha**	Aplicación foliar semanal en periodo vegetativo en cultivo sano
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i>)	2 l/ha**	Aplicación foliar semanal en período vegetativo entre los 40 días y 90 días luego del trasplante
Cebolla (<i>Allium</i> spp.)	2 l/ha**	Aplicación foliar semanal en período vegetativo entre los 30 días y 90 días luego del trasplante
Soya (<i>Glycine max</i>)	0.8 l/ha**	Realizar una aplicación foliar en fase de desarrollo
Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	2 l/ha***	Aplicación foliar semanal en período vegetativo y luego de la poda
Maíz (<i>Zea mays</i>)	0.5 l/ha****	Realizar una aplicación foliar en fase de desarrollo
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	0.8 l/ha*****	Realizar una aplicación foliar en fase de desarrollo
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	0.5 – 0.75 l/ha*****	Aplicación foliar aérea en fase de desarrollo dentro del plan de aplicaciones de la finca
Palma aceitera (<i>Elaeis guineensis</i>)	2.5 ml/ l agua	Realizar una aplicación en vivero mediante pulverización con bomba de mochila

Volumen de agua/ha: *1000 l; **400 l; ***800 l; ****300 l; ***** 200 l; *****16 l

La información presentada sirve como una referencia, la cual puede ser acogida de acuerdo al estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima y propiedades físicas y químicas del suelo.

COMPATIBILIDAD

Presenta incompatibilidad con productos de reacción alcalina, pero se puede mezclar con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes de uso común. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad a pequeña escala.

PRECAUCIONES DE MANEJO Y USO

- No coma, beba o fume durante las aplicaciones;
 - Evitar el contacto con la piel, respirar o ingerir producto durante la aspersión, usar traje protector, guantes de caucho, máscara y lentes protectores;
 - Cambiarse la ropa que ha estado en contacto con el producto; lávela con agua y jabón después de cada uso.
 - Lávese bien las partes contaminadas con agua y jabón después de la aplicación.
-

TITULAR DEL REGISTRO:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA

Dirección: Av. Pampite s/n y pasaje Darío Donoso, Edificio Officenter, Oficina No. 315, Cumbayá, Quito – Ecuador

Teléfono: (593)2500 0134

<http://summitagroecuador.com/>